

DESCRIPTION

DE DEUX *Lamia* NOUVELLES, PAR M. GORY.

Séance du 5 novembre 1834.

Lamia Jucunda, GORY, Madagascar. Du cabinet de M. Gory.

Long. 16 lig. Larg. 5 lig. $\frac{1}{5}$.

Pl. 2. A. fig. 1.

Tête large. Yeux petits, lisses.

Corselet plus long que large, plus élevé à sa partie antérieure, avec une pointe de chaque côté dans son milieu.

Ecusson petit, arrondi.

Elytres carrées à la base, arrondies à l'extrémité.

Entièrement d'un beau noir velouté.

Les articles des antennes, excepté les deux premiers, ont deux petites taches d'un blanc-bleu, l'une à la naissance, l'autre à la terminaison.

Sur le front et le devant de la tête, une grande tache qui

se dilate au-dessous des yeux, avec une bande transversale derrière eux.

Sur chaque côté du corselet, une grande tache et une petite triangulaire en face de l'écusson, celui-ci entièrement couvert d'une tache.

Sur chaque élytre, trois taches et quatre points placés ainsi : la première tache est humérale et ne touche pas la suture ; elle laisse apercevoir l'angle de l'élytre ; elle se courbe au-dessous de cet angle, suit un peu le côté externe et se relève un peu sur l'élytre ; la seconde, transversale, est placée un peu plus bas que le milieu ; elle touche la suture et n'atteint que les deux tiers de la largeur ; la troisième, également transversale et onduleuse, n'est pas tout-à-fait à l'extrémité, et ne touche ni la suture ni le bord externe ; le premier point, qui est le plus gros, est du côté externe et vis-à-vis la seconde tache ; le second et le troisième sont sur une ligne transversale entre la deuxième et la troisième taches ; enfin, le quatrième est à l'extrémité du côté de la suture.

Toutes ces taches et points sont d'un jaune-souci foncé, entourés d'une bordure blanche.

La poitrine et les bords des segments de l'abdomen sont aussi couverts de ces taches ; le reste des parties inférieures est couvert d'une couleur cendrée, argentée.

Je possède une variété de cette espèce, dont les antennes sont toutes noires, dont les deux premières taches des élytres joignent la suture et le côté externe, qui n'a qu'un seul point entre les deuxième et troisième taches, et enfin dont la couleur des taches et des points est d'un beau jaune d'ocre, sans entourage blanc.

Lamia Radiata (1), GORY, Galam. Du cabinet de M. Gory.

Long. 15 lig. Larg. 5 lig.

Pl. 2. A. fig. 2.

Tête avec une petite côte longitudinale élevée dans son milieu. Yeux très-grands et noirs.

Corselet avec un fort tubercule qui se termine en pointe de chaque côté, plissé en arrière et formant une espèce de bourrelet avant le bord postérieur, celui-ci ondulé.

Écusson assez grand et arrondi à son extrémité.

Elytres presque parallèles, arrondies à leur extrémité, ayant chaque angle huméral relevé et couvert de quelques petites aspérités.

Entièrement d'une couleur cendrée un peu rougeâtre.

Sur le front, une grande tache carrée; sur le corselet, deux taches commençant un peu en avant de sa longueur et allant jusqu'au bord postérieur; sur chaque élytre, trois taches de forme triangulaire placées ainsi; la première, humérale; la deuxième, la plus grande, occupe le milieu; la troisième, la plus petite, est placée à l'extrémité. Ces taches sont parallèles et n'atteignent ni le bord externe ni la suture. Toutes ces taches sont d'un blanc verdâtre. Il existe, en outre, aux parties inférieures de cet insecte une large bande de même couleur que les taches qui occupent les deux côtés de la tête, du corselet, de la poitrine et de l'abdomen.

Je dois cette magnifique espèce à la générosité de M. Reich.

(1) Cette espèce est figurée sous le n° 5, et nommée *Lamia bicroiséc* dans une planche in-4° d'insectes lithographiés par Delorieux, et imprimée chez C. Motte, de Paris. (Commission de publication.)